

โรคพิษสุนัขบ้า



เป็นแล้วตาย

ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

คำแนะนำ
สำหรับคนเลี้ยง
สุนัขและแมว



ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป
ปีแรก ฉีด 2 ครั้ง ปีต่อไปฉีดซ้ำทุกปี



ทำหมัน

ไม่ให้มีลูกมากเกินไป



เลี้ยงในรั้วบ้าน

ไม่ปล่อยให้พเนจรในที่สาธารณะ

เมื่อถูก
สุนัขหรือแมว
กัด ข่วน เลีย
บาดแผล ต้องรีบ...



คนหรือสัตว์
เมื่อแสดงอาการจะ
ตายทุกราย!!



สุนัขหรือแมว
ที่มีเจ้าของ
ก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีน



โรคนี้
ไม่ได้เป็น
เฉพาะหน้าร้อน

"ล้างแผล ใส่ยา กักหมา ฆ่าหมอม ฉีดวัคซีนให้ครบชุด"



ล้างแผล

ด้วยสบู่และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา

รักษาแผลสด



กักหมา

ไว้ดูอาการ 10 วัน
หากตายรีบแจ้งปศุสัตว์



ฆ่าหมอม

เพื่อรับการป้องกันโรค
และมาตามนัดทุกครั้ง

คาถา 5 ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



**อย่า
แหย่**

หรือเล่นกับสุนัขแรงๆ
ให้ตกใจ หรือโมโห



**อย่า
แหย่**

สุนัขที่กำลังกัดกัน



**อย่า
ยุ่ง**

กับสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ

สุนัขให้ตกใจ

**อย่า
เหยียบ**



จานข้าวที่สุนัข
หรือแมวกำลังกิน

**อย่า
หยิบ**



ทำบุญได้บาป



โปรด



**ให้อาหารแก่สุนัข
หรือแมวจรจัด**

เพราะอาจทำให้สุนัขหรือแมวจรจัดกัดกัน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ และทำให้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการกัดคน และแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นด้วย

